


RZEPAK OZIMY

RGT TREZZOR

- JAKOŚĆ
- PLON
- ZIMOTRWAŁOŚĆ
- ZAOLEJENIE
- ODPORNOŚĆ NA SZUSZĘ
- POWTARZALNOŚĆ



2014	2015	2016	2017
112%	117%	112%	–

Badania rejestrowe

112% 117% 112% –

Badania COBORU rozpoznawcze

– 110% 103% 111%

Badania firmowe RAGT, metodyką COBORU

116% 118% 115% 115%

www.ragt.pl

RAGT Semences Polska sp. z o.o.

ul. Sadowa 10A • 87-148 Łysymice • tel. 56 6783279

Wyniki CCA COBORU 2015 – plon nasion [dt/ha]

Lokalizacja (województwo)	Wzorzec	Średnia odmian	RGT TREZZOR
Białogard (zachodniopomorskie)	46,1	44,6	44,4
Karżniczka (pomorskie)	61,7	63,3	70,0
Wróćkowo (warmińsko-mazurskie)	53,4	54,2	62,4
Śrem wójtowski (wielkopolskie)	54,0	57,6	63,6
Kościelna Wieś (wielkopolskie)	52,3	53,0	54,1
Chrzastowo (kujawsko-pomorskie)	58,0	59,0	62,8
Głębokie (kujawsko-pomorskie)	36,7	39,7	42,7
Sulejów (świętokrzyskie)	53,7	52,1	61,0
Kawęczyn (mazowieckie)	47,0	46,9	48,4
Bezek (podlaskie)	54,5	55,4	59,0
Tomaszów Bol. (dolnośląskie)	37,3	40,2	41,9
Tarnów (dolnośląskie)	26,0	26,4	23,2
Głubczyce (opolskie)	48,4	49,7	56,9
Kochcice (śląskie)	48,5	49,3	56,7
Przeclaw (lubelskie)	38,6	38,6	43,2

Wyniki CCA COBORU 2016 – plon nasion [dt/ha]

Lokalizacja (województwo)	Wzorzec	RGT TREZZOR
Karżniczka (pomorskie)	56,9	48,7
Wróćkowo (warmińsko-mazurskie)	24,9	26,6
Chrzastowo (kujawsko-pomorskie)	32,8	32,5
Głębokie (kujawsko-pomorskie)	22,6	23,8
Sulejów (świętokrzyskie)	40,7	45,5
Kawęczyn (mazowieckie)	13,3	10,8
Bezek (podlaskie)	51,4	47,4
Tomaszów Bol. (dolnośląskie)	27,1	31,7
Tarnów (dolnośląskie)	39,5	43,0
Głubczyce (opolskie)	40,8	44,5
Kochcice	39,3	44,5
Przeclaw (lubelskie)	44,6	44,5



RZEPAK OZIMY

RGT TREZZOR

Złoto na twoim polu

- Rejestracja Francja 2014, w badaniach rejestrowych COBORU 2014 i 2015
- Odmiana zakwalifikowana do badań PDO w sezonie 2017–2018 po bardzo dobrych wynikach doświadczeń w CCA przez COBORU
- Bardzo wysoka mrozoodporność
- Odmiana nadająca się do uprawy na wszystkich rodzajach gleb i w każdym regionie Polski
- Odmiana średnio-wczesna o bardzo wysokim potencjale plonowania nadająca się na wczesny jak i opóźniony wysiew



STOP Fungicyd w okresie jesiennym
STOP Regulator w okresie jesiennym

RZEPAK OZIMY

RGT TREZZOR

PROFIL ODMIANY

Rejestracja: 2014 Francja
 Typ: mieszaniec zrestorowany
 Wczesność: średnio-wczesna
 Termin kwitnienia: średnio-wczesny
 Termin zbioru: średnio-wczesny

Charakterystyka zdrowotna

- Sucha zgnilizna: dobra
- Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra
- Cylindrosporioza: dobra

Charakterystyka agronomiczna

- Wysokość: niska do średniej
- Odporność na wyleganie: bardzo dobra
- Wigor jesienny: dobry
- Wzrost jesienny: umiarkowany
- Wrażliwość na clomazon: brak

Charakterystyka technologiczna

- Zaolejenie: bardzo wysokie
- Zawartość białka: bardzo wysoka
- Zawartość GLS: niska
- MTZ: średni

PORADY SIEWNE DLA ROLNIKA

- Ilość docelowa roślin na polu: gęstość w rzędzie max 15 roślin na m.b.
- Wysiew siewnikiem klasycznym: 30–45 roślin/m²**
- Wysiew siewnikiem pneumatycznym: 20–30 roślin/m²**
- Optymalny termin siewu
- W zależności od regionu: od 10 sierpnia do 5 września**


Po więcej informacji zapraszamy do dystrybutorów regionalnych lub bezpośrednio do firmy.

www.ragt.pl

RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 ul. Sadowa 10A • 87-148 Łysymice • tel. 56 6783279

DOŚWIADCZENIA POLOWE

Wyniki rejestrowe COBORU 2015 – % wzorca




Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Po wieloletnich doświadczeniach odbywających się w wielu miejscach, w których przeprowadzane są doświadczenia RAGT2N można powiedzieć, że firma nasza posiada w swojej puli genowej pozytywną odpowiedź na obecność wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Firma RAGT skoncentrowała swoje działania na identyfikacji stabilności i plastyczności odmian, co oznacza znalezienie poligenicznego rozwiązania tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy TuYV poprzez badania genotypu i środowiska w uprawie rzepaku. Firma nasza wprowadza do swoich odmian kompleksowy mechanizm obronny POLIGENICZNO-ILÓŚCIOWY dzięki któremu roślina posiada odpowiedni poziom tolerancji na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.

Wyniki, które posiadamy z doświadczeń firmowych przeprowadzonych przede wszystkim na terenie Niemiec świadczą o wysokiej tolerancji odmiany RGT TREZZOR na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.

RGT Trezzor ma bardzo dobre wyniki w COBORU ale także na wielu polach produkcyjnych w Polsce. Odmiana pokazała swoje wysokie plonowanie w trudnych warunkach glebowo klimatycznych ale także w niekorzystnych warunkach zdrowotno-środowiskowych co świadczy o jej dużej zdrowotności i odporności poligenicznej na patogeny występujące w uprawie rzepaku ozimego.

Oficjalne wyniki rejestrowe w Europie 2015 – % wzorca



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

TREZZOR jest najnowszą odmianą rzepaku ozimego którą chcielibyśmy polecić do uprawy we wszystkich rejonach kraju. Odmiana ta podczas dwuletnich badań w COBORU wykazała się bardzo wysokim plonowaniem ziarna oraz oleju. Rzepak ten należy do hybryd typu MSL jednej z najlepszych hodowli.

TREZZOR cechuje się bardzo wysoką odpornością na niskie temperatury o czym świadczy przetrwanie tej odmiany w obecnym sezonie wegetacyjnym.

TREZZOR odmiana pokazała swoją wysoką przydatność do uprawy w bardzo trudnych warunkach suszy glebowej w Polsce w sezonie 2014–2015 (genetyczne przystosowanie odmiany).

TREZZOR odmiana o bardzo wysokiej przydatności do przemysłu olejarskiego z bardzo wysokim zaolejeniem ziarna i równoczesnym stabilnym i niskim poziomem glukozydów.

TREZZOR odmiana która jest relatywnie łatwa w prowadzeniu i potrafi wybaczyć niedoskonałości agrotechniczne.

TREZZOR charakteryzuje się niskim pokrojem rośliny bez tendencji do wybijania łanu dzięki czemu nadaje się do zrównoważonej uprawy.

TREZZOR przydatny w uprawie na wszystkie rodzaje gleb.

TREZZOR odmiana przebadana przez COBORU zarówno w badaniach rejestrowych jak i rozpoznawczych w połączeniu z badaniami firmowymi RAGT w sezonie 2014–2015 pokazała swój potencjał plonotwórczy w stresowych warunkach uprawy.

TREZZOR najwyżej plonująca odmiana w badaniach rejestrowych COBORU w rejonie VI.

TREZZOR odmiana o elastycznym terminie wysiewu nadająca się na wczesny jak i opóźniony wysiew 15.08–15.09 w zależności od rejonu kraju.